

Wytyczne
do sporządzania Rocznych Planów Łowieckich na sezon łowiecki 2020/2021
dla obwodów łowieckich znajdujących się w zasięgu terytorialnym
Okręgu Olsztyńskiego PZŁ

ZWIERZYNA GRUBA

Jeleń szlachetny

Przyrost zrealizowany ustalić na poziomie **40 do 70 % stanu łań na 10.03.br.** (uwzględniając obecność wilków). Plan odstrzału jeleni ustalić na poziomie średniorocznego pozyskania z 3 ostatnich lat, chyba że populacja przewyższa stany docelowe zapisane w Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych, obowiązujących do 31.03.2027 r., wtedy należy zaplanować odstrzał wyższy niż założony przyrost zrealizowany. Jeżeli stan docelowy jest większy od stanu faktycznego należy zaplanować pozyskanie o kilka procent mniejsze od planowanego przyrostu zrealizowanego.

Przy ustalaniu RPŁ należy przyjąć następujące wskaźniki:

Odstrzał w grupach płciowo wiekowych:

- byki ok. 25-30 %
- łanie 40-60 %
- cielęta do 30 %

Odstrzał byków:

- **selekcyjnych** - (1-9 poroże/2-10 r. ż.) - **80-85 %** ogólnej liczby byków do pozyskania z uwzględnieniem zasady, iż byków selekcyjnych w wieku do 5. roku życia nie powinno się pozyskiwać więcej niż 40 %
- **łownych** - (10 poroże/ 11 r. ż. i starsze) - **15-20 %** ogólnej liczby byków do pozyskania

Daniel

Jest to gatunek coraz powszechniej występujący na terenie Olsztyńskiego Okręgu PZŁ. Planując pozyskanie należy kierować się poniższymi wskaźnikami:

Zagęszczenie – w korzystnych warunkach do 30-35 osobników na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu, stosunek płci 1:1,5 na korzyść łań, przyrost zrealizowany **40 do 70 % stanu łań na 10.03.br.** (uwzględniając obecność wilków).

Odstrzał w grupach płciowo wiekowych:

- byki 30-40 %
- łanie do 50 %
- cielęta do 30 %

Odstrzał byków:

- **selekcyjnych** - (1-6 poroże/ 2-7 r. ż.) - **85 %** ogólnej liczby byków do pozyskania z uwzględnieniem zasady, iż byków selekcyjnych w wieku do 3 roku życia nie powinno się pozyskiwać więcej niż 40 %
- **łownych** - (7 poroże/ 8 r. ż. i starsze) **15-20 %** ogólnej liczby byków do pozyskania

Sarna europejska

Inwentaryzacja i planowanie łowieckie w odniesieniu do tego gatunku musi być przeprowadzone szczególnie starannie, ze względu na presję drapieżników i wałęsających się psów. Przyrost zrealizowany ustala się na **25 do 70 % stanu kóz na 10 marca br.** (należy uwzględnić warunki atmosferyczne, **ilość stwierdzonych upadków** zwierzyny oraz **obecność i presji dużych drapieżników: wilka i rysia**). Planując odstrzał – podobnie jak w przypadku jeleni - należy odnieść do docelowej liczebności populacji zapisanej w WLPH.

Odstrzał w grupach płciowo-wiekowych:

- rogacze ok. 40 max. 45 %
- kozy ok. 40 %
- koźlęta ok. 20 % (max do 30 %)

Odstrzał rogaczy:

- **selekcyjnych** - (1-4 poroże/2-5 r. ż.) - **max. 70 %** ogólnej liczby rogaczy do pozyskania
- **łownych** - (5 poroże/6 r. ż. i starsze) **min. 30 %** ogólnej liczby rogaczy do pozyskania

Dzik

Liczebność populacji należy określić jak najdokładniej bazując na wszystkich dostępnych dla koła danych (obserwacje całoroczne, poziom szkód łowieckich, obserwacje w czasie polowań zbiorowych, liczbą pozyskanych dzików w ostatnich 2 sezonach łowieckich z uwzględnieniem zauważonych tendencji wzrostu lub spadku liczebności, obserwacje w czasie polowań na nęciskach, nocne inwentaryzacje z użyciem nokto i termowizji i inne).

Większość obszaru Olsztyńskiego Okręgu PZŁ znajduje się w strefie czerwonej i niebieskiej, gdzie ilość upadków spowodowanych występowaniem ASF jest znaczna i w większości wypadków wyklucza możliwość lokalnych migracji. W takich przypadkach można zakładać, że inwentaryzacja oraz zakładany przyrost odnosić się będzie do niewielkiej lokalnej populacji.

W obwodach łowieckich zlokalizowanych w zachodniej, częściowo centralnej oraz południowej części okręgu (strefa żółta) w czasie sezonu można było zaobserwować znaczący wzrost populacji, z całą pewnością nie będący wynikiem naturalnego cyklu rozrodczego, a jak wskazują obserwacje spowodowany raczej migracją dzików opuszczających tereny dotknięte ASF.

W przypadku postępu choroby i wystąpienia masowych upadków w obwodach znajdujących się aktualnie w strefie żółtej, niezmiernie ważnym argumentem będą wyniki poszukiwań martwych dzików i bieżące raportowanie tego stanu inspekcji weterynaryjnej co jednoznacznie wykaże trudności w wykonaniu odstrzału w wysokości zakładanej w marcu 2020.

Wobec takiej sytuacji najwłaściwszym rozwiązaniem w skali całego okręgu wydają się być: jak najdokładniejsza inwentaryzacja oraz założenie przyrostu zgodnego z biologicznymi możliwościami gatunku. **Przyrost zrealizowany planujemy w wysokości do 250 % ogólnego stanu populacji na dzień 10.03.br., w zależności od obserwowanej struktury płciowej i wiekowej populacji występującej w danym obwodzie. Planowany odstrzał minimalny musi uwzględnić przyjęty poziom przyrostu zrealizowanego oraz zakładać doprowadzenie i utrzymanie liczebności populacji dzika na poziomie 1 osobnika na 1000 ha obwodu.**

Koło łowieckie działając w takich realiach musi mieć świadomość iż każde działanie związane z populacją dzika musi być odpowiednio udokumentowane i na bieżąco raportowane odpowiednim instytucjom w formie wymaganej prawem.

ZWIERZYNA DROBNA

Lis

Przyrost zrealizowany 100 - 150 % stanu na 10.03. br.

Zagęszczenie 4-8 osobników na 1000 ha obwodu

(docelowo powinno być 2-3 osobniki/ 1000 ha.)

Pozyskanie na poziomie min. 100 do 200 % stanu na 10.03. br.

Jenot

Przyrost zrealizowany ok. 100 % stanu na 10.03. br.

Zagęszczenie ok. 2-3 osobników na 1000 ha obwodu.

Pozyskanie na poziomie ok. 100-150 % stanu na 10.03. br.

Borsuki, Tchórze, Kuny

Odstrzał na poziomie do 50 % stanu na 10.03. br.

Norki amerykańskie

Odstrzał na poziomie do 100 % stanu na 10.03. br.

Zając

Przy zagęszczeniu ok. 6-10 osobników na 100 ha obwodu można planować pozyskanie. **Przy zagęszczeniu poniżej 6 szt. na 100 ha powierzchni obwodu lub powierzchni polnej obwodu nie planujemy pozyskania**

Pozyskanie ustalamy na poziomie 5-10 % stanu wiosennego

Szakał i Szop pracz

O ile występowanie tego gatunku zostało stwierdzone należy zaplanować pozyskanie w wysokości szacowanej liczby występujących osobników.

Przy planowaniu odstrzału zwierzyny grubej należy wziąć pod uwagę również rozmiar szkód powodowanych na polach i w lesie.

ŁOWCZY OKRĘGOWY
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ
w Olsztynie

Romuald Amborski

DYREKTOR
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Olsztynie

mgr inż. Mariusz Orzechowski