

Wytyczne
do sporządzania Rocznych Planów Łowieckich na sezon łowiecki 2023/2024
dla obwodów łowieckich znajdujących się w zasięgu terytorialnym
Okręgu Olsztyńskiego PZŁ

ZWIERZYNA GRUBA

W przypadku **łośa, jelenia szlachetnego i daniela** przyrost ustalić na poziomie od 30 do 60 % stanu samic na dzień inwentaryzacji. Plan odstrzału w populacjach ustabilizowanych i liczebnie zbliżonych do stanów docelowych ustalić w zależności od wyników inwentaryzacji, założonego przyrostu, stanów docelowych zapisanych w Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych oraz wielkości śmiertelności pozalowieckiej (zwłaszcza drapieżnictwa – obecność wilków). Powinien on wynosić ok. 10-20 % mniej od zakładanego przyrostu.

(przykładowo – inwentaryzacja 200 jeleni: 80 byków, 20 cielaków, 100 łań, przyrost 50 % stanu łań czyli 50 sztuk, odstrzał 10 % mniej czyli 45 osobników)

W przypadku **saren** przyrost należy zaplanować na poziomie adekwatnym do stanu populacji i presji dużych drapieżników, ściśle według danych z każdego obwodu. Średnie wartości przyrostu wynoszą od 30 do 60 %, przy czym w przypadku konkretnych obwodów wartości te mogą być niższe. Z kolei ze względu na szczególnie wysoką śmiertelność pozalowiecką odstrzał powinien być planowany na poziomie 20-40 % niżej od zakładanego przyrostu

(przykładowo – inwentaryzacja 100 saren: 40 rogaczy, 10 kozłaków, 50 kóz, przyrost 30 % stanu kóz czyli 15 szt., odstrzał 30 % mniejszy od przyrostu czyli 10 osobników)

Przy ustalaniu RPŁ należy przyjąć następujące wskaźniki:

Odstrzał w grupach płciowo wiekowych zwierzyny płowej

- samce 30-40 %
- samice 40-50 %
- młode 10-30 %

Docelowa struktura płci w populacjach ustabilizowanych powinna wynosić ok. 1:1. W przypadku populacji o niskim zagęszczeniu oraz będących pod wpływem silnej presji drapieżników do czasu osiągnięcia liczebności określonej w WŁPH wskazany jest stosunek płci w układzie 1:2 na korzyść samic. Po osiągnięciu odpowiedniej liczebności populacji należy skorygować strukturę płci do zalecanej 1:1 (1:0,8- 1:1,2)

Odstrzał byków jeleni:

- **selekcyjnych** - (1-9 poroże/2-10 r. ż.) - **80-85 %** ogólnej liczby byków do pozyskania z uwzględnieniem zasady, iż byków selekcyjnych w wieku do 5. roku życia nie powinno się pozyskiwać więcej niż 40 %

- **łownych** - (10 poroże/ 11 r. ż. i starsze) - **15-20 %** ogólnej liczby byków do pozyskania

Odstrzał byków danieli:

- **selekcyjnych** - (1-6 poroże/ 2-7 r. ż.) **85 %** ogólnej liczby byków do pozyskania z uwzględnieniem zasady, iż byków selekcyjnych w wieku do 3 roku życia nie powinno się pozyskiwać więcej niż 40 %

- **łownych** - (7 poroże/ 8 r. ż. i starsze) **15 %** ogólnej liczby byków do pozyskania

Odstrzał rogaczy:

- **selekcyjnych** - (1-4 poroże/2-5 r. ż.) – **ok. 70 %** ogólnej liczby rogaczy do pozyskania

- **łownych** - (5 poroże/6 r. ż. i starsze) **ok. 30 %** ogólnej liczby rogaczy do pozyskania

Dzik

Liczebność populacji należy określić jak najdokładniej bazując na wszystkich dostępnych dla koła danych (obserwacje całoroczne, poziom szkód łowieckich, liczbą pozyskanych dzików w ostatnich 2 sezonach łowieckich z uwzględnieniem zauważonych tendencji wzrostu lub spadku liczebności, obserwacje w czasie polowań na nęciskach, nocne inwentaryzacje z użyciem nokto- i termo-wizji i inne).

W części obwodów łowieckich wykonany odstrzał dzików w porównaniu do stanu wiosennego zdecydowanie przekracza możliwości biologiczne populacji tj. 250-300 % przyrostu w stosunku do stanu wiosennego. Może to świadczyć o lokalnych migracjach spowodowanych strukturą upraw rolnych (uprawy kukurydzy na ziarno), niestaránnie prowadzonej inwentaryzacji lub celowego zaniżania wiosennej liczebności populacji. Należy dołożyć wszelkich starań aby inwentaryzacja dzików jak najdokładniej odzwierciedlała stan populacji w łowisku.

Przyrost zrealizowany planujemy w wysokości do 250 % ogólnego stanu populacji na dzień inwentaryzacji w zależności od obserwowanej struktury płciowej i wiekowej populacji występującej w danym obwodzie. Planowany odstrzał minimalny musi uwzględnić przyjęty poziom przyrostu zrealizowanego oraz zakładać doprowadzenie i utrzymanie liczebności populacji dzika na poziomie 1 osobnika na 1000 ha obwodu. Zaleca się realizację odstrzału przede wszystkim wśród warchlaków.

ZWIERZYNA DROBNA

Lis

Przyrost zrealizowany 100 - 150 % stanu na dzień inwentaryzacji.

Średnie zagęszczenie lisa w okręgu olsztyńskim wynosi 6-8 osobników na 1000 ha obwodu (docelowo powinno być 2-3 osobniki/ 1000 ha.)

Pozyskanie na poziomie min. 100 do 200 % stanu na dzień inwentaryzacji.

Szakał

O ile występowanie tego gatunku zostało stwierdzone należy zaplanować pozyskanie w wysokości szacowanej liczby występujących osobników.

Borsuki, Tchórze, Kuny

Odstrzał na poziomie do 50 % stanu na dzień inwentaryzacji.

Norki amerykańskie

Odstrzał na poziomie do 100 % stanu na dzień inwentaryzacji.

Zając

Przy zagęszczeniu ok. 6-10 osobników na 100 ha obwodu można planować pozyskanie. **Przy zagęszczeniu poniżej 6 szt. na 100 ha powierzchni obwodu lub powierzchni polnej obwodu nie planujemy pozyskania**

Pozyskanie ustalamy na poziomie 5-10 % stanu wiosennego

Zastępca Dyrektora
ds. Gospodarki Leśnej
mgr inż. Wojciech Matuszak

ŁOWCZY OKRĘGOWY
Zarządu Okręgowego PZŁ
w Olsztynie
Romuald Amborski